



CETUXIMAB FU CARBOPLATINE

Cancer des voies aéro-digestives supérieures

2 rue Moll, 49933 Angers Cedex 9
02 41 35 27 00 (standard) / 27 05
(CATU)

MEDICAMENTS	<ul style="list-style-type: none">• CETUXIMAB (nom commercial : ERBITUX)• CARBOPLATINE• FLUOROURACILE
REALISATION DES CYCLES	<ul style="list-style-type: none">• toutes les 3 semaines (J22) : 4 jours de perfusion en hospitalisation complète (soit 4 nuits à l'hôpital), ou en partie à domicile avec une pompe portable• toutes les semaines : perfusion de CETUXIMAB• perfusion par le site implantable
NOMBRE DE CYCLES	<ul style="list-style-type: none">• 4 à 6
PRINCIPAUX EFFETS SECONDAIRES	
<p>Le traitement ne provoque pas de chute des cheveux.</p> <p>Allergie : elle peut survenir dans les premières minutes de la perfusion, au 1^{er} ou 2^{ème} cycle - prévention : traitement antiallergique systématique avant la perfusion.</p> <p>Nausées-vomissements : ils peuvent survenir du 1^{er} au 5^{ème} jour.</p> <ul style="list-style-type: none">- prévention et traitement : médicaments contre les vomissements (<i>antiémétiques</i>) prescrits systématiquement (<i>ondansétron, emend</i>), bien s'hydrater, manger léger. <p>Diarrhée - traitement : boissons abondantes, loperamide.</p> <p>Réactions cutanées :</p> <ul style="list-style-type: none">- éruption qui ressemble à de l'acné (éruption pseudo-acnéiforme) - traitement : soins anti-acné.- irritation de la paume des mains ou de la plante des pieds (syndrome main-pied) - traitement : application de crèmes hydratantes. <p>Irritation de la bouche (mucite) ou aphtes : ils peuvent survenir de 7 à 10 jours après les cycles - prévention et traitement : bains de bouche.</p> <p>Baisse des globules blancs (neutropénie) : elle est systématique vers les 8^{ème}- 12^{ème} jours ; elle est sans risque sauf s'il apparaît de la fièvre (+ de 38°5 ou persistance d'une T° à 38°) : il faut alors faire une prise de sang (NFS).</p> <ul style="list-style-type: none">- prévention : prescription éventuelle de facteur de croissance par l'oncologue.- conduite à tenir : antibiotiques si neutrophiles < 1000 et T° > 38°5. <p>Baisse des plaquettes (thrombopénie) : il n'y a pas de risque de saignement au-dessus de 20000 plaquettes.</p> <p>Baisse de l'hémoglobine (anémie) : elle peut devenir gênante en dessous de 10 g.</p> <ul style="list-style-type: none">- prévention et traitement : perfusions de fer, érythropoïétine (EPO) ou transfusion. <p>Fatigue : il est normal d'être fatigué en cours de chimiothérapie - traitement : respecter des temps de repos dans la journée, mais essayer de conserver une activité même modérée.</p> <p>Constipation et céphalées : dues à l'ondansétron - traitement : symptomatique (<i>paracétamol, accélérateur du transit</i>).</p> <p>Insomnie, énervement, rougeur du visage : dus aux corticoïdes utilisés en perfusion avant le cycle de chimiothérapie, ils disparaissent rapidement.</p> <p>Arrêt des règles : il peut être définitif ou transitoire. Prévoir une méthode de contraception car la chimiothérapie est totalement incompatible avec une grossesse.</p>	

Pour tout effet secondaire (cité ou non dans le tableau) qui vous pose problème, n'hésitez pas à contacter votre médecin traitant qui est au courant de votre traitement.