



FU CISPLATINE

Cancer des voies aéro-digestives supérieures

2 rue Moll, 49933 Angers
Cedex 9
02 41 35 27 00 (standard) /
27 05 (CATU)

MEDICAMENTS	<ul style="list-style-type: none">• CISPLATINE• FLUOROURACILE
REALISATION DES CYCLES	<ul style="list-style-type: none">• toutes les 3 semaines (J22)• 4 jours de perfusion en hospitalisation complète (soit 4 nuits à l'hôpital), ou en partie à domicile avec une pompe portable• perfusion par le site implantable
NOMBRE DE CYCLES	<ul style="list-style-type: none">• 4 à 6

PRINCIPAUX EFFETS SECONDAIRES

Le traitement ne provoque pas de chute des cheveux.

Nausées-vomissements : ils peuvent survenir du 1^{er} au 5^{ème} jour.

- **prévention et traitement** : médicaments contre les vomissements (*antiémétiques*) prescrits systématiquement (*ondansétron, emend*), bien s'hydrater, manger léger.

Irritation de la bouche (*muçite*) ou aphtes : ils peuvent survenir de 7 à 10 jours après les cycles.

- **prévention et traitement** : bains de bouche.

Irritation de la paume des mains ou de la plante des pieds (*syndrome main-pied*) :

- **traitement** : application de crèmes hydratantes.

Diarrhée - traitement : boissons abondantes, loperamide.

Fourmillements dans les extrémités (*paresthésies*) - traitement : suspension du cisplatine.

Bourdonnements d'oreilles (*acouphènes*) ou baisse de l'audition - traitement : suspension du cisplatine.

Insuffisance rénale - prévention : contrôle de la fonction rénale avant chaque cure, hydratation abondante par perfusion au moment de l'hospitalisation, et par voie orale au retour à domicile (*au moins 1.5 l par jour*).

Baisse des globules blancs (*neutropénie*) : elle est systématique vers les 8^{ème}-12^{ème} jours ; elle est sans risque sauf s'il apparaît de la fièvre (+ de 38°5 ou persistance d'une T° à 38°) : il faut alors faire une prise de sang (NFS).

- **prévention** : prescription éventuelle de facteur de croissance par l'oncologue.

- **conduite à tenir** : antibiotiques si neutrophiles < 1000 et T° > 38°5.

Baisse des plaquettes (*thrombopénie*) : il n'y a pas de risque de saignement au dessus de 20000 plaquettes.

- **traitement** : transfusion sur avis médical.

Baisse de l'hémoglobine (*anémie*) : elle peut devenir gênante en dessous de 10 g.

- **prévention et traitement** : perfusions de fer, érythropoïétine (EPO) ou transfusion.

Fatigue : il est normal d'être fatigué en cours de chimiothérapie.

- **traitement** : respecter des temps de repos dans la journée, mais essayer de conserver une activité même modérée.

Constipation et céphalées : dues à l'ondansétron - **traitement** : symptomatique (*paracétamol, accélérateur du transit*).

Insomnie, énervement, rougeur du visage : dus aux corticoïdes utilisés en perfusion avant le cycle de chimiothérapie, ils disparaissent rapidement.

Arrêt des règles : il peut être définitif ou transitoire. Prévoir une méthode de contraception car la chimiothérapie est totalement incompatible avec une grossesse.

Pour tout effet secondaire (*cité ou non dans le tableau*) qui vous pose problème, n'hésitez pas à contacter votre médecin traitant qui est au courant de votre traitement.

AAA MO PP 000 – Version 0 – 01/10/2011

Si vous imprimez et conservez ce document, assurez-vous régulièrement qu'il corresponde bien à la dernière version disponible sur Blue Medi.