



## **RADIO-CHIMIO CONCOMITANTE** **Cancer ORL, postopératoire**

2 rue Moll, 49933 Angers Cedex 9  
02 41 35 27 00 (standard) / 27 05  
(CATU)

<b>MEDICAMENT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>CISPLATINE</b></li><li>• <b>RADIOTHERAPIE CONCOMITANTE</b></li></ul>
<b>REALISATION DES CYCLES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• toutes les 3 semaines (J22) : 24 heures de perfusion continue (<i>soit une nuit à l'hôpital</i>), ou une journée en hôpital de jour avec hydratation orale abondante</li><li>• perfusion par le site implantable ou le cathéter</li><li>• radiothérapie concomitante pendant 7 semaines</li></ul>
<b>NOMBRE DE CYCLES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 à 3</li></ul>

### **PRINCIPAUX EFFETS SECONDAIRES**

**Le traitement ne provoque pas de chute des cheveux.**

**Nausées-vomissements** : ils peuvent survenir du 1<sup>er</sup> au 5<sup>ème</sup> jour.

- **prévention et traitement** : médicaments contre les vomissements (*antiémétiques*) prescrits systématiquement (*ondansétron, emend*), bien s'hydrater, manger léger.

**Irritation de la bouche (*mucite*) ou aphtes** : ils peuvent survenir de 7 à 10 jours après les cycles.

- **prévention et traitement** : bains de bouche.

**Fourmillements dans les extrémités (*paresthésies*) - traitement** : suspension du cisplatine.

**Bourdonnements d'oreilles (*acouphènes*) ou baisse de l'audition - traitement** : suspension du cisplatine.

**Insuffisance rénale - prévention** : contrôle de la fonction rénale avant chaque cure, hydratation abondante par perfusion au moment de l'hospitalisation, et par voie orale au retour à domicile (*au moins 1.5 l par jour*).

**Baisse des globules blancs (*neutropénie*)** : elle est systématique vers les 8<sup>ème</sup>-12<sup>ème</sup> jours ; elle est sans risque sauf s'il apparaît de la fièvre (+ de 38°5 ou persistance d'une T° à 38°) : il faut alors faire une prise de sang (NFS).

- **prévention** : prescription éventuelle de facteur de croissance par l'oncologue
- **conduite à tenir** : antibiotiques si neutrophiles < 1000 et T° > 38°5

**Baisse des plaquettes (*thrombopénie*)** : il n'y a pas de risque de saignement au dessus de 20000 plaquettes.

- **traitement** : transfusion sur avis médical.

**Baisse de l'hémoglobine (*anémie*)** : elle peut devenir gênante en dessous de 10 g.

- **prévention et traitement** : perfusions de fer, érythropoïétine (EPO) ou transfusion.

**Fatigue** : il est normal d'être fatigué en cours de chimiothérapie.

- **traitement** : respecter des temps de repos dans la journée, mais essayer de conserver une activité même modérée.

**Constipation et céphalées** : dues à l'ondansétron - **traitement** : symptomatique (*paracétamol, accélérateur du transit*).

**Insomnie, énervement, rougeur du visage** : dus aux corticoïdes utilisés en perfusion avant le cycle de chimiothérapie, ils disparaissent rapidement.

**Arrêt des règles** : il peut être définitif ou transitoire. Prévoir une méthode de contraception car la chimiothérapie est totalement incompatible avec une grossesse

**Pour tout effet secondaire ( *cité ou non dans le tableau*) qui vous pose problème, n'hésitez pas à contacter votre médecin traitant qui est au courant de votre traitement.**