

28 – VEINE JUGULAIRE INTERNE rapports à la base du crâne et dans l'espace rétro-stylien

AU NIVEAU DE LA BASE DU CRANE

Dans le trou déchiré postérieur :

Elle fait suite à ce niveau au *sinus latéral*

Orifice ovalaire à grand axe oblique en avant, en dedans. Creusé dans la suture pétro-occipitale

La veine occupe le segment post de l'orifice

Dans le trou déchiré post :

Les compartiments ant et post sont séparés par le *ligament pétro-occipital* tendu entre les épines jugulaires

Le *compartiment ant* comporte le XI, le X (près du bord interne); le IX (encochant le bord externe), le sinus pétreux inférieur (se jette dans le golfe de la jugulaire, sous la base du crâne), l'artère méningée post (branche de la pharyngienne ascendante)

Le *compartiment post* comporte le golfe de la jugulaire dont les rapports sont :

En haut : plancher de la caisse du tympan, du vestibule, du canal semi-circulaire post

En avant : orifice d'entrée du canal carotidien (cet orifice est séparé de la fosse jugulaire par la crête jugulaire où s'ouvre le canal tympanique dans lequel s'engage le nerf de Jacobson), et la fossette pétreuse

En arrière : l'apophyse jugulaire de l'occipital

En dehors : apophyse styloïde, 3^o portion du VII, trou stylo-mastoïdien (VII et artère stylo-mastoïdienne), rameau auriculaire du X

En dedans : condyle de l'occipital, fosse condylienne ant où s'ouvre le canal de l'hypoglosse

RAPPORTS AVEC LES PAROIS DE L'ESPACE DE L'ESPACE RETRO-STYLIEN

Elle est située à la partie postéro-externe de l'espace rétro-stylien ou espace sous-parotidien postérieur

En dehors :

- Mastoïde et SCM

- Ventre post du digastrique qui la croise (il est longé à son bord sup par l'artère auriculaire post et à son bord inf par l'artère occipitale)

En arrière :

- Apophyses transverses de l'atlas et axis

- Muscles et aponévrose prévertébraux

En avant :

- apophyse styloïde en haut

- partie externe du rideau stylien : M. stylo-hyoïdien

- parotide en avant du rideau stylien

En dedans :

- elle est loin de la paroi interne qui est constituée par le pharynx

RAPPORTS AVEC LES ELEMENTS VASCULO-NERVEUX

En dedans :

- carotide interne
- IX
- XI
- XII

En arrière :

- X
- Ganglion cervical supérieur du sympathique

En avant :

- Branche externe du XI

En dehors :

- ganglions sous-parotidiens postérieurs, inconstants.

A la partie inf de l'espace, la veine passe sous le ventre post du digastrique et apparaît dans la région carotidienne