



CETUXIMAB TPF

Cancer des voies aéro-digestives supérieures

2 rue Moll, 49933 Angers Cedex 9
02 41 35 27 00 (standard) / 27 05 (CATU)

MEDICAMENTS	<ul style="list-style-type: none"> • CETUXIMAB (nom commercial : ERBITUX) • DOCETAXEL (nom commercial : TAXOTERE) • CISPLATINE et FLUOROURACILE
REALISATION DES CYCLES	<ul style="list-style-type: none"> • toutes les 3 semaines (J22) • 24h de perfusion soit une nuit à l'hôpital, puis 5 jours de perfusion continue de Fluorouracile sur pompe portable à domicile • perfusion par le site implantable
NOMBRE DE CYCLES	<ul style="list-style-type: none"> • en fonction de l'efficacité et de la tolérance.

PRINCIPAUX EFFETS SECONDAIRES

Chute des cheveux (alopécie) : elle apparaît vers le 15^{ème} jour après le 1^{er} cycle.

Allergie : elle peut survenir dans les premières minutes de la perfusion, au 1^{er} ou 2^{ème} cycle - **prévention** : traitement antiallergique systématique avant la perfusion.

Nausées-vomissements : ils peuvent survenir du 1^{er} au 5^{ème} jour - **prévention et traitement** : médicaments contre les vomissements (*antiémétiques*) prescrits systématiquement (*ondansétron, emend*), bien s'hydrater, manger léger.

Irritation de la bouche (mucite) ou aphtes : ils peuvent survenir de 7 à 10 jours après les cycles - **prévention et traitement** : bains de bouche.

Diarrhée - traitement : boissons abondantes, loperamide.

Réactions cutanées :

- **éruption qui ressemble à de l'acné (éruption pseudo-acnéiforme)** - **traitement** : soins anti-acné.
- **irritation de la paume des mains ou de la plante des pieds (syndrome main-pied)** - **traitement** : application de crèmes hydratantes.

Fourmillements dans les extrémités (paresthésies) : traitement : suspension du cisplatine.

Bourdonnements d'oreilles (acouphènes) ou baisse de l'audition - **traitement** : suspension du cisplatine.

Insuffisance rénale - **prévention** : contrôle de la fonction rénale avant chaque cure, hydratation abondante par perfusion au moment de l'hospitalisation, et par voie orale au retour à domicile (*au moins 1.5 l par jour*).

Oedèmes des membres ou épanchements - **prévention** : cortisone systématique au moment des cycles - **traitement** : suspension du Docetaxel.

Fragilisation des ongles - **prévention** : application de vernis la veille et pendant 2 jours après les cycles, associé à des applications et massage des ongles avec de la crème avibon - **traitement** : si rougeurs des ongles : bains d'hexomédine ou de chlorhexidine.

Baisse des globules blancs (neutropénie) : elle est systématique vers les 8^{ème}-12^{ème} jours ; elle est sans risque sauf s'il apparaît de la fièvre (+ de 38°5 ou persistance d'une T° à 38°) : il faut alors faire une prise de sang (NFS) - **prévention** : prescription systématique de facteur de croissance par l'oncologue - **conduite à tenir** : antibiotiques si neutrophiles < 1000 et T° > 38°5.

Baisse des plaquettes (thrombopénie) : il n'y a pas de risque de saignement au-dessus de 20000 plaquettes - **traitement** : transfusion sur avis médical.

Baisse de l'hémoglobine (anémie) : elle peut devenir gênante en dessous de 10 g - **prévention et traitement** : perfusions de fer, érythropoïétine (EPO) ou transfusion.

Fatigue : il est normal d'être fatigué en cours de chimiothérapie - **traitement** : respecter des temps de repos dans la journée, mais essayer de conserver une activité même modérée.

Insomnie, énervement, rougeur du visage : dus aux corticoïdes utilisés en perfusion ou comprimés avant le cycle de chimiothérapie, ils disparaissent rapidement.

Constipation et céphalées : dues à l'ondansétron - **traitement** : symptomatique

Arrêt des règles : il peut être définitif ou transitoire. Prévoir une méthode de contraception car la chimiothérapie est totalement incompatible avec une grossesse.

Pour tout effet secondaire (cité ou non dans le tableau) qui vous pose problème, n'hésitez pas à contacter votre médecin traitant qui est au courant de votre traitement.

AAA MO PP 000 – Version 0 – 01/10/2011

Si vous imprimez et conservez ce document, assurez-vous régulièrement qu'il corresponde bien à la dernière version disponible sur Blue Medi.