



## DOCETAXEL CARBOPLATINE

### Cancer de l'ovaire, du poumon

2 rue Moll, 49933 Angers  
Cedex 9  
02 41 35 27 00 (standard) / 27  
05 (CATU)

MEDICAMENTS	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>DOCETAXEL (nom commercial : TAXOTERE)</b></li><li>• <b>CARBOPLATINE</b></li></ul>
REALISATION DES CYCLES	<ul style="list-style-type: none"><li>• toutes les 3 semaines (J22)</li><li>• 2h de perfusion en hôpital de jour</li><li>• perfusion par le site implantable</li></ul>
NOMBRE DE CYCLES	<ul style="list-style-type: none"><li>• en fonction de l'efficacité et de la tolérance</li></ul>
<b>PRINCIPAUX EFFETS SECONDAIRES</b>	
<p><b>Chute des cheveux (alopécie)</b> : elle apparaît vers le 15<sup>ème</sup> jour après le 1<sup>er</sup> cycle.</p> <p><b>Nausées-vomissements</b> : ils peuvent survenir du 1<sup>er</sup> au 5<sup>ème</sup> jour.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>prévention et traitement</b> : médicaments contre les vomissements (<i>antiémétiques</i>) prescrits systématiquement (<i>ondansétron, emend</i>), bien s'hydrater, manger léger.</li></ul> <p><b>Diarrhée - traitement</b> : boissons abondantes, loperamide.</p> <p><b>Irritation de la bouche (mucite) ou aphtes</b> : ils peuvent survenir de 7 à 10 jours après les cycles.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>prévention et traitement</b> : bains de bouche.</li></ul> <p><b>Oedèmes des membres ou épanchements</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>prévention</b> : cortisone systématique au moment des cycles - <b>traitement</b> : suspension du Docetaxel.</li></ul> <p><b>Fragilisation des ongles</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>prévention</b> : application de vernis la veille et pendant 2 jours après les cycles, associé à des applications et massage des ongles avec de la crème avibon.</li><li>- <b>traitement</b> : si rougeurs des ongles : bains d'hexomédine ou de chlorhexidine.</li></ul> <p><b>Fourmillements dans les extrémités (paresthésies) - traitement</b> : baisse de dose ou suspension du docetaxel.</p> <p><b>Baisse des globules blancs (neutropénie)</b> : elle est systématique vers les 8<sup>ème</sup>-12<sup>ème</sup> jours ; elle est sans risque sauf s'il apparaît de la fièvre (+ de 38°5 ou persistance d'une T° à 38°) : il faut alors faire une prise de sang (NFS)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>prévention</b> : prescription éventuelle de facteur de croissance par l'oncologue</li><li>- <b>conduite à tenir</b> : antibiotiques si neutrophiles &lt; 1000 et T° &gt; 38°5</li></ul> <p><b>Baisse des plaquettes (thrombopénie)</b> : il n'y a pas de risque de saignement au dessus de 20000 plaquettes.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>traitement</b> : transfusion sur avis médical.</li></ul> <p><b>Baisse de l'hémoglobine (anémie)</b> : elle peut devenir gênante en dessous de 10 g.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>prévention et traitement</b> : perfusions de fer, érythropoïétine (EPO) ou transfusion.</li></ul> <p><b>Fatigue</b> : il est normal d'être fatigué en cours de chimiothérapie - <b>traitement</b> : respecter des temps de repos dans la journée, mais essayer de conserver une activité même modérée.</p> <p><b>Constipation et céphalées</b> : dues à l'ondansétron - <b>traitement</b> : symptomatique</p> <p><b>Insomnie, énervement, rougeur du visage</b> : dus aux corticoïdes utilisés en perfusion ou comprimés avant le cycle de chimiothérapie, ils disparaissent rapidement.</p> <p><b>Arrêt des règles</b> : il peut être définitif ou transitoire. Prévoir une méthode de contraception car la chimiothérapie est totalement incompatible avec une grossesse.</p>	

**Pour tout effet secondaire (cité ou non dans le tableau) qui vous pose problème, n'hésitez pas à contacter votre médecin traitant qui est au courant de votre traitement.**