



DOCETAXEL CISPLATINE

Cancer du poumon non à petites cellules

2 rue Moll, 49933 Angers
02 41 35 27 00 (standard)
/ 27 05 (CATU)

MEDICAMENTS	<ul style="list-style-type: none"> • DOCETAXEL (nom commercial : TAXOTERE) • CISPLATINE
REALISATION DES CYCLES	<ul style="list-style-type: none"> • toutes les 3 semaines (J22) • 24h de perfusion soit une nuit à l'hôpital • perfusion par le site implantable
NOMBRE DE CYCLES	<ul style="list-style-type: none"> • en fonction de l'efficacité et de la tolérance

PRINCIPAUX EFFETS SECONDAIRES

Chute des cheveux (alopécie) : elle apparaît vers le 15^{ème} jour après le 1^{er} cycle.

Nausées-vomissements : ils peuvent survenir du 1^{er} au 5^{ème} jour.

- **prévention et traitement** : médicaments contre les vomissements (*antiémétiques*) prescrits systématiquement (*ondansétron, emend*), bien s'hydrater, manger léger.

Diarrhée - traitement : boissons abondantes, loperamide.

Irritation de la bouche (mucite) ou aphtes : ils peuvent survenir de 7 à 10 jours après les cycles.

- **prévention et traitement** : bains de bouche.

Bourdonnements d'oreilles (acouphènes) ou baisse de l'audition - traitement : suspension du cisplatine.

Insuffisance rénale - prévention : contrôle de la fonction rénale avant chaque cure, hydratation abondante par perfusion au moment de l'hospitalisation, et par voie orale au retour à domicile (*au moins 1.5 l par jour*).

Oedèmes des membres ou épanchements :

- **prévention** : cortisone systématique au moment des cycles - **traitement** : suspension du Docetaxel.

Fourmillements dans les extrémités (paresthésies) - traitement : baisse de dose ou suspension du cisplatine et ou du docetaxel.

Fragilisation des ongles :

- **prévention** : application de vernis la veille et pendant 2 jours après les cycles, associé à des applications et massage des ongles avec de la crème avibon.

- **traitement** : si rougeurs des ongles : bains d'hexomédine ou de chlorhexidine.

Baisse des globules blancs (neutropénie) : elle est systématique vers les 8^{ème}- 12^{ème} jours ; elle est sans risque sauf s'il apparaît de la fièvre (+ de 38°5 ou persistance d'une T° à 38°) : il faut alors faire une prise de sang (NFS)

- **prévention** : prescription éventuelle de facteur de croissance par l'oncologue.

- **conduite à tenir** : antibiotiques si neutrophiles < 1000 et T° > 38°5.

Baisse des plaquettes (thrombopénie) : il n'y a pas de risque de saignement au-dessus de 20000 plaquettes.

- **traitement** : transfusion sur avis médical

Baisse de l'hémoglobine (anémie) : elle peut devenir gênante en dessous de 10 g.

- **prévention et traitement** : perfusions de fer, érythropoïétine (EPO) ou transfusion.

Fatigue : il est normal d'être fatigué en cours de chimiothérapie - **traitement** : respecter des temps de repos dans la journée, mais essayer de conserver une activité même modérée.

Constipation et céphalées : dues à l'ondansétron - **traitement** : symptomatique

Insomnie, énervement, rougeur du visage : dus aux corticoïdes utilisés en perfusion ou comprimés avant le cycle de chimiothérapie, ils disparaissent rapidement.

Arrêt des règles : il peut être définitif ou transitoire. Prévoir une méthode de contraception car la chimiothérapie est totalement incompatible avec une grossesse.

Pour tout effet secondaire (cité ou non dans le tableau) qui vous pose problème, n'hésitez pas à contacter votre médecin traitant qui est au courant de votre traitement.