



METHOTREXATE 40

Môle hydatiforme, cancer du sein, des VADS

MEDICAMENT	<ul style="list-style-type: none">• METHOTREXATE
REALISATION DES CYCLES	<ul style="list-style-type: none">• toutes les semaines (J8)• 30 minutes de perfusion en hôpital de jour• perfusion par le site implantable
NOMBRE DE CYCLES	<ul style="list-style-type: none">• en fonction de l'efficacité et de la tolérance

PRINCIPAUX EFFETS SECONDAIRES

Le traitement ne provoque pas de chute des cheveux.

Les nausées-vomissements sont peu probables.

Irritation de la bouche (*mucite*) ou aphtes : ils peuvent survenir de 7 à 10 jours après le début des cycles.

- **prévention et traitement :** bains de bouche.

Baisse des globules blancs (*neutropénie*) : elle est systématique vers les 8^{ème}-12^{ème} jours ; elle est sans risque sauf s'il apparaît de la fièvre (+ de 38°5 ou persistance d'une T° à 38°) : il faut alors faire une prise de sang (NFS).

- **prévention :** prescription éventuelle de facteur de croissance par l'oncologue.

- **conduite à tenir :** antibiotiques si neutrophiles < 1000 et T° > 38°5.

Baisse des plaquettes (*thrombopénie*) : il n'y a pas de risque de saignement au-dessus de 20000 plaquettes.

- **traitement :** transfusion sur avis médical.

Baisse de l'hémoglobine (*anémie*) : elle peut devenir gênante en dessous de 10 g.

- **prévention et traitement :** perfusions de fer, érythropoïétine (EPO) ou transfusion.

Fatigue : il est normal d'être fatigué en cours de chimiothérapie - **traitement :** respecter des temps de repos dans la journée, mais essayer de conserver une activité même modérée.

Arrêt des règles : il peut être définitif ou transitoire. Prévoir une méthode de contraception car la chimiothérapie est totalement incompatible avec une grossesse.

La prise d'aspirine est contre-indiquée avec le méthotrexate.

Pour tout effet secondaire (cité ou non dans le tableau) qui vous pose problème, n'hésitez pas à contacter votre médecin traitant qui est au courant de votre traitement.